



NUTRICIA

50 LAT
ZA AWANSOWANYCH
BADAŃ NA MLEKIEM MATKI

Bebilon
PROFUTURA®

DUO
BIOTIK

NASZA NAJBARDZIEJ
ZA AWANSOWANA FORMUŁA
GDY WYŁĄCZNE KARMIENIE PIERSIĄ
NIE JEST MOŻLIWE

Kompletna odżywczo formuła już od wczesnych
chwil zaspokajająca wszystkie potrzeby
żywieniowe niemowląt^{1,2}

1

MLEKO POCZĄTKOWE
OD URODZENIA

Także do dokarmiania³

¹ Gdy nie karmisz piersią. ² Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa.

Kompletna odżywczo formuła już od wczesnych chwil zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe niemowląt^{1,2}

Bez oleju palmowego

Także do dokarmiania³
¹ Białko 1 PROFUTURA DUOBIOTIK jest równieś odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zostaje konieczność dokarmiania.

Jedli dziecko nie jest karmione piersią, **Bebilon PROFUTURA DUOBIOTIK 1** tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedynym pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

Składniki: Laktoza; z mleka; odulizowane mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, olejki roślinne (słonecznikowy, słonecznikowy, kukurudzowy, ziołowy), zmieszanych proszokach, polisacharydów GOS, mleko 38,3%, koncentrat serwatki z mleka, białko serwatki w proszku, mleko, 2'-halektylolaktoza, FI, 0,71%, trisaktozydohexarydy FOS, 0,52%, olej rybi, wosk, olej z Moringa i olej z pestek, sól, cholek choleg, witamina E, napsoc, emulgator (Cecylitryny z soją), inozytyl, barwniki, żelazo, L-karnityna, cytryn, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urynowego 5'-Istosorowego, kwas cytrynowy 5'-monofosforowy, kwas adenynowy 5'-Istosorowy, sól sodowa kwasu urynowego 5'-Istosorowego, sól sodowa kwasu guanynowego 5'-Istosorowego), przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylowy), kwas pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miód, laktam, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, sól, selen, magnez, witamin K, biotyna, witamina D, witamina B12.

Wartości odżywcze 100 ml gotowego do spożycia mleka:

Wartości energetyczne: 216 kJ / 56 kcal. **Tłuszcz:** 3,4 g, w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 1,6 g, jednonasycone 1,1 g, wielonasycone 0,5 g, w tym kwas linolowy (LA) 440 mg, kwas α -linolenowy (ALA) 54,9 mg, kwas arachidonowy (AA) 16,3 mg, kwas dokozahexaenowy (DHA) 16,5 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,5 mg. **Węglowodany:** 7,3 g, w tym: cukry 2,2 g, w tym: laktoza 2,0 g, **Białko:** 0,7 g, w tym oligosacharydy GOS (galaktooligosacharydy) 0,48 g, FOS (fruktooligosacharydy) 0,08 g, 2FL (2'-fukziooligosacharydy) 0,08 g, 3FL (3'-galaktooligosacharydy) 0,08 g. **Witamina:** Witamina A 50 µg, Witamina D1 4 µg, Witamina E 1,2 mg, Witamina K 4,5 µg, Witamina C 9,5 mg, Witamina B12 0,07 mg, Ryboflawina 0,14 mg, Niacyna 0,43 mg, Witamina B6 0,049 mg, Kwas foliowy 0,5 µg, Witamina B7 0,17 µg, Biotyna 0,8 µg, Kwas pantotenowy 0,54 mg. **Składniki mineralne:** Sól 0,9 mg, Potas 34 mg, Chlór 52 mg, Wapń 60 mg, Fosfor 41 mg, Magnez 5,4 mg, Żelazo 0,35 mg, Litym 0,64 mg, Miedź 0,053 mg, Mangan 0,025 mg, Płatek s- 0,006 mg, Selen 0,03 µg, Sód 10 µg, **Inne:** Cholek 22 mg, Nukleotydy 2,3 mg, Inozytyl 0,3 mg, Probiotki oligosacharydy GOS 0,2 g.

Sposób przygotowania. Zawartość szaszki służy do przygotowania 150 ml mleka (1 porcja).

Do umytego butelki i smoczka wyciągnij w wodzie przez 30 min. Smaż w wodzie przez 5 min, po czym zgotuj do suchego reszka (ok. 40-50°C). Do przygotowania butelki wlej 150 ml wody i dodaj zawartość szaszki Bebilon 1. Zamieszaj butelkę energicznie porażką pionową do całkowitego rozpuszczenia proszku. 4. Zalej do butelki w odpowiedniej smoczki. Postaw temperaturę mleka wewnątrz stronę produktu dzieci. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Ważne informacje: karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli istnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przeżył zymału w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwiastków, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie: niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Instrukcja karmienia dziecka: mleko **Bebilon PROFUTURA DUOBIOTIK** powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Niech nie należy używać ponownie niewyżytej części mleka. Nie wykorzystywać porcji mleka należy wyjąć bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenkach mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.



20,4 g e

Mleko początkowe w proszku.

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Boboniewicka 8,
00-728 Warszawa

01 28651-01-0002
10820652



01 28651-01-0002
10820652 189705