

WARTOŚĆ ODŻYWCZA



Składniki:

syrop glukozowy, kazeinian wapnia z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, wysoko-koleinowy olej słonecznikowy, olej słonecznikowy, maltodekstryna, wapń, sód, potas, olej rybi, magnez, L-cysteina, chlorek cholin, olej z Mortierella alpina, emulgator (lecytyna z soi), witamina C, inozytol, tauryna, L-tryptofan, L-karnityna, żelazo, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenylo-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozylo-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.

100 ml gotowego do spożycia mleka

Wartość energetyczna	276 kJ/66 kcal
Tłuszcz, w tym:	3,4 g
- kwasy nasycone	1,5 g
- kwasy jednonienasycone	1,3 g
- kwasy wielonienasycone	0,6 g
-- kwas linolowy (LA)	448 mg
-- kwas α -linolenowy (ALA)	55 mg
-- kwas arachidonowy (AA)	17 mg
-- kwas dokozaheksaenowy (DHA)	17 mg
-- kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,7 mg
Weglowodany, w tym:	7,6 g
- cukry	1,2 g
-- laktoza	<0,007 g
Białko	1,3 g
-L-karnityna	2,1 mg
Witaminy	
Witamina A	58 μ g
Witamina D	1,4 μ g
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	4,4 μ g
Witamina C	9,3 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,046 mg

100 ml gotowego do spożycia mleka

Kwas foliowy	8,3 μ g
Witamina B12	0,17 μ g
Biotyna	1,6 μ g
Kwas pantotenowy	0,53 mg
Składniki mineralne	
Sód	22,1 mg
Potas	80 mg
Chlorek	51 mg
Wapń	68 mg
Fosfor	49 mg
Magnez	5,6 mg
Żelazo	0,71 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,052 mg
Mangan	0,01 mg
Fluorek	$\leq 0,006$ mg
Selen	3,0 μ g
Jod	13 μ g
Inne	
Tauryna	5,4 mg
Cholina	22 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Inozytol	7,3 mg

Bebilon®

BEZ LAKTOZY

Specjalnie dopasowana formuła*



Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Mleko początkowe powinno być stosowane jedynie po konsultacji z lekarzem. Produkt może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowlęcia w pierwszych 6 miesiącach życia. Jeżeli lekarz podejmie decyzję o stosowaniu produktu powyżej 6. miesiąca życia niemowlęcia, powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety. Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych zębów, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Opakowanie **Bebilon® Bez Laktozy** pozwala na przygotowanie około 30 butelek mleka o pojemności 100 ml.

Chcesz porozmawiać o rozwoju i żywieniu Twojego dziecka?

Skontaktuj się z Ekspertkami Nutricia: Zadzwoni: **801 16 55 55** lub wejdź na www.bebiprogram.pl i porozmawiaj na czacie lub wyslij wiadomość.

MLEKO POCZĄTKOWE od urodzenia

✓ nie zawiera laktozy*



Nieodpowiednie dla niemowląt chorych na galaktozemię

TABELA ŻYWIENIA



NASZA UNIKALNA EKSPERTYZA

Bebilon® Bez Laktozy

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję
1. miesiąc	7	90-120	3-4
2.-3. miesiąc	6	120	4
4. miesiąc	6	150	5
5.-6. miesiąc	4	180	6
7. miesiąc i powyżej	3	210	7

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka = 4,4 g proszku

Sposób przygotowania:

- Umij ręce i wyparuj naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
- Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do 40 °C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
- Używaj wyłączonej załączonej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu **Bebilon® Bez Laktozy**. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka.
- Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
- Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umij butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Najlepiej spożyć przed: data na dnie puszki. Przechowywanie:

Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C • Nie przechowywać w lodówce • Chronić od wilgoci • Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą • Zużyć nie później niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu puszki • Nie zaleca się przesyppowania produktu do innych pojemników • Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Już od ponad 120 lat NUTRICIA specjalizuje się w żywieniu we wczesnym okresie życia, a od 40 lat prowadzi pionierskie badania z udziałem zaangażowanego zespołu ponad 500 naukowców i ekspertów. Nasze badania umożliwiły nam rozwinięcie unikalnej receptury **Bebilon® Bez Laktozy**, którego kompletna receptura jest dostosowana specjalnie, by wspierać potrzeby żywienia niemowląt na wczesnym etapie rozwoju.

40
-lat-
badań

Nasza unikalna kompozycja składników



* nie zawiera laktozy

Bebilon® Bez Laktozy, mleko początkowe, nieodpowiednie dla niemowląt chorych na galaktozemię lub z alergią na białka mleka krowiego.

Następny krok:

✓ Po 6. miesiącu życia, skonsultuj z lekarzem stosowanie **Bebilon® 2 Advance PRONUTRA**



Mleko początkowe w proszku.

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa



400g e